

Aktuelles aus dem Beratungsdienst

Neue Techn. Weisung Salmonellen

- Gilt ab Einstellung 1. Mai 2021
- Neu für Legebetriebe:
 - Ausstattungskontrolle amtlich, **muss** nun unter Aufsicht Veterinäramt durchgeführt werden. Wird durch Kanton gezahlt
 - Auch gleichaltrige Herden einzeln zu beproben
 - Nur noch Schlepptupfer/Sockentupfer

Neue Techn. Weisung Salmonellen

- 15-Wochenintervall zwischen Proben
=> bei verlängertem Umtrieb je nach
Dauer eine 4. Probe vor
Ausstellungskontrolle nötig.
- Termine bitte einhalten!
- Bei Fragen helfen wir gerne!

Neue Techn. Weisung Salmonellen

- Neu für Aufzuchtbetriebe:
 - Kotprobe in AW 15 nicht mehr amtlich, d.h. offiziell durch Beratungsdienst zu nehmen
 - Auch gleichaltrige Herden einzeln zu beproben

Futterzusätze bei Einstallung Legehennen

- Clostat: Direkt nach Einstallung, 25g (= 1 Messlöffel) pro Tag, während 10-14 Tagen
- Evt. Biacton: 200-300 g / Tag
- Ideal: Bestellung noch während Legezeit der vorangehenden Herde

Futterzusätze bei Einstallung Kühen

- Essig in Stülptränken: 0,5% bis max. 1%
- Evt. Biacton über das Futter, im Verhältnis 1-2 kg/to Futter

Betriebscheck 2020

- Resultate insgesamt sehr gut, Betriebe gut und gewissenhaft geführt.
- Häufigste Abweichungen (B-Abweichung)
 - AKB: 30% der Betriebe
 - Weidestrukturierung: 20% der Betriebe
 - Befiederung: 18% der Betriebe
 - Stallklima: 8% der Betriebe

Betriebscheck 2020

- AKB
 - Sandhöhe muss über 15 cm sein
 - Tränken von 1. Mai bis 31. September installiert und funktionstüchtig
 - Keine Verpappung der Einstreu, muss scharrfähig sein

Betriebscheck 2020

- Weidestrukturierung
 - Mind. 21 Strukturen für 2040 Hennen (Bio-RiLi)
 - 50% davon natürlich
 - Henne muss innerhalb 20 m die nächste Struktur erreichen
 - Struktur muss 2m² Schatten bieten
 - Wenn natürliche Struktur noch klein, mit künstlicher Struktur ergänzen

Gestaltung Weide

Aus der Präsentation von Reto Baumgartner, anlässl. Regionaltagung 2019





Fichtengruppe

Hainbuche (Weissbuche)



Kopfweiden als Abgrenzung



Trauerweide

Zeder



Gestaltung Weide

Aus der Präsentation von Peter Lüscher, anlässl. Regionaltagung 2019



Gestaltung Weide

- Einsatz Getreide vor SWA. Problem: Dauerhafte Begrünung gefordert
- Statt 14m Öffnungen nur 7m
=> Hennen durch Kanäle leiten, um Rest zu schonen
- Einsatz von PVC-Gitter auf stark strapazierten Flächen


Stallklima

- Schwieriges Thema
- Solltemperatur v.a. im Winter nicht zu hoch => höhere Lüftungsrate
- Erste Massnahme: Drosselklappen bei Ventilator öffnen, damit schlechte Luft entweichen kann, dann Ventilatorleistung erhöhen
- Im Winter 2x/Woche misten
- Wichtig: Luft am Boden muss sich bewegen. Z.B. Installation von zusätzlichen Lüftern

Histomonaden

Einzelliger Parasit

Schädigung von Darm und Leber



Histomonaden

- Symptome
 - Matte, schläfrige Tiere
 - Abgänge
 - Abmagerung
 - Sekundärinfektionen, v.a. Coli
 - v.a. braune Hennen betroffen

Histomonaden

- Nachweis über Histologie oder PCR am Tierspital
- Bei Befall keine direkte Behandlung möglich
- Prophylaxe:
 - Einsatz von Dosto (Oreganoprodukt)
 - Entwurmen (Heterakis ist Zwischenwirt)

Offene Fragen?

