

Actualités du service technique

Nouvelle directive Salmonelles

- Valable pour les lots mis en place depuis le 1. mai 2021
- Nouveau pour la production d'oeuf:
 - Contrôle avant abattage est officiel, doit être effectué sous surveillance du service vétérinaire cantonal. Est payé par le canton.
 - Les troupeaux du même âge sont à contrôler séparément
 - Seulement traîneau / pédisac

Nouvelle directive Salmonelles

- Intervalle de 15 semaines entre les prélèvements => sur des séries prolongées suivant la durée, il y a besoin d'un 4ème prélèvement avant le contrôle de sortie.
- Svp respectez les délais!
- En cas de question, n'hésitez pas nous contacter

Nouvelle directive Salmonelles

- Nouveau pour les éleveurs:
 - Prélèvement de fientes en semaine d'âge 15 plus officiel, peut alors être pris officiellement par les techniciens
 - Les troupeaux du même âge sont à contrôler séparément

Additifs alimentaires lors de la mise en place des poules

- Clostat: Directement après la mise en place, 25g (= 1 mesure) par jour, pendant 10-14 jours
- Evt. Biacton: 200-300 g / jour
- Idéalement: Commande encore durant la série précédente

Additifs alimentaires lors de la mise en place des poussins

- Vinaigre dans les coupoles: 0,5% jusqu'à max. 1%
- Evt. Biacton dans l'aliment, 1-2 kg/to d'aliment

Check d'exploitation 2020

- Résultats très bon, exploitations bien tenues
- Ecart les plus fréquents (Ecart B)
 - Jardin d'hiver: 30% des exploitations
 - Structures au parc: 20% des exploitations
 - Plumage: 18% des exploitations
 - Climat au poulailler: 8% des exploitations

Check d'exploitation 2020

- Jardin d'hiver
 - Sable: en minimum 15 cm d'hauteur
 - Abreuvoirs: En fonction du 1 mai au 31 septembre
 - Litière: pas de papette, grattable

Check d'exploitation 2020

- Structuration du parc
 - Au minimum 21 structures pour 2040 Hennen (Directives Bio)
 - Dont 50% naturel
 - La poule doit pouvoir atteindre la prochaine structure après maximum 20 m
 - 2m² d'ombre par structure
 - Si la structure naturelle est encore petite, ajouter une structure artificielle

Structuration du parc

Photos de la présentation de Reto Baumgartner, lors de la conférence régionale 2019





**Groupes de sapin
rouge**

**Charme /
Charmille**



Tétard



Saule pleureur



Cèdre



Structuration du parc

Photos de la présentation de Peter Lüscher, lors de la conférence régionale 2019



Structuration du parc

- Semis de céréales devant le parcours mauvais temps. Problème: Il faut avoir constamment une surface verte
- Au lieu de 14m d'ouvertures seulement 7m
=> Guider les poules par des canaux, pour épargner le reste
- Mise de treilli PVC sur des surfaces fortement utilisées


Climat du poulailler

- Sujet difficile
- Température cible surtout en hiver pas trop haut
=> plus de ventilation
- Première mesure: Ouvrir les clapets du ventilateur, pour que l'air puisse partir, seulement après augmenter la vitesse du ventilateur
- En hiver: Sortir le fumier 2x par semaine
- Important: L'air au sol doit être bougé. P. ex. Monter des ventilateurs en plus

Histomonades

Parasite monocellulaire

Dégâts sur les intestins et le foie



Histomonades

- Symptomes
 - Poules somnolents
 - Pertes
 - Perte de poids
 - Infections secondaires, surtout Coli
 - Surtout sur les poules brune

Histomonades

- Vérification par histologie ou PCR au Tierspital
- En cas de l'infestation pas de traitement direct possible
- Prophylaxie:
 - Utilisation de Dosto (Produit d'oregano)
 - Vermifuger (Heterakis est un hôte intermédiaire)

Questions?

